

# أوراق عمل الكيمياء

## الصف الأول الثانوي

### المستوى الدراسي الأول

### للعام ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ

## الفصل الثالث

# تركيب الذرة

## اعداد المعلم / أحمد بن علي النجمي

| الفصل الثالث                                | تركيب الذرة<br>الأفكار القديمة للمادة 3.1  | الصف ١٠<br>المادة كيمياء            |
|---|--|-------------------------------------|
| تقويم ختامي للدرس                           |  | Greek Philosophers الفلاسفة الإغريق |
| اسم الطالب                                  | الدرجة   | ١٠                                  |
| الزمن : ١٠ دقائق                            |  |                                     |
| أجب عن جميع الأسئلة التالية :               |  |                                     |
| 16  |  |                                     |
| الأهداف:                                    | ١. تقارن بين النماذج الذرية لديمقريطس وأرسطو وجون دالتون .<br>٢. تفهم كيف فسرت نظرية دالتون الذرية قانون حفظ الكتلة.   |                                     |
| العالم المكتشف                              | الاكتشاف   |                                     |
| الفلاسفة الإغريق                            | <p>- كانت قدرة العقل والتفكير الذهني هي الطرائق الأولية للوصول إلى الحقيقة.</p> <p>- استنتج الكثير من الفلاسفة الإغريق أن المادة مكونة من أربعة أشياء هي :<br/>١- .....<br/>٢- .....<br/>٣- .....<br/>٤- .....</p> <p>- لقد كان من المتفق عليه أن المادة يمكن تجزئتها إلى أجزاء صغيرة فأصغر.</p> <p>- ورغم أن هذه الأفكار الأولية كانت إبداعية إلا أنه لم يكن هناك وسيلة متوافرة لاختبار صدقها.</p>  |                                     |
| ديمقريطس                                    | <p>- اقترح فكرة أن المادة ليست قابلة للتقسام إلى مالا نهاية .</p> <p>- المادة مكونة من ..... صغيرة تسمى ..... تتحرك في الفراغ.</p> <p>- ان ..... صلبة ومتجانسة لا يمكن تحطيمها أو استحداثها أو تجزئتها.</p>  |                                     |
| أرسطو                                       | <p>- رفض فكرة ديمقريطس ( أن الذرات تتحرك في الفراغ ) وذلك لعدم إيمانه ..</p> <p>- أعاد فكرة أن المادة مكونة من التراب والهواء والماء والنار.</p> <p>- استمرت فكرت أرسطو أكثر من ألفي سنة .</p> <p>- أفكار أرسطو عن الطبيعة أنكرت وجود ..... وبشكل لا يصدق.</p> <p>- فقد كان تأثير أرسطو عظيما وظل التقدم العلمي بدانيا فيما يتعلق بالذرات.</p>   |                                     |
| جون دالتون                                  | <p>- أدت التجارب التي قام بها دالتون في القرن التاسع عشر إلى بداية تطور النظرية الحديثة.</p> <p>- اعتمد على نتائج البحث ..... وبذلك أحيأ أفكار ديمقريطس مرة أخرى .</p> <p>- بسبب تطور العلوم قام دالتون بالكثير من التجارب التي سمحت له بدعم فرضيته حيث درس الكثير من التفاعلات الكيميائية</p> <p>- استطاع تحديد النسب ..... للعناصر الداخلة في التفاعلات.</p> <p>- ادت نتائج أبحاثه إلى ما يطلق عليه <u>نظرية</u> ..... الذرية التي قام بطرحها عام 1803 م.</p>  |                                     |
| الأفكار                                     | <p>- النقاط الرئيسية لنظرية دالتون الذرية هي :</p> <p>١- .....<br/>٢- .....<br/>٣- .....<br/>٤- .....<br/>٥- .....</p>   |                                     |
| نظرية دالتون<br>الذرية وقانون<br>حفظ الكتلة | <p>تفسر نظرية دالتون الذرية قانون حفظ الكتلة في التفاعل الكيميائي.</p> <p>- كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة ( علل )<br/>لأن ما يحدث في التفاعل ما هو إلا .....</p> <p>- لقد أدى تقديم دالتون أدلته التجريبية المقننة وتفسيره الواضح لبنية المركبات ولحفظ الكتلة على قبول عام لنظريته الذرية</p> <div style="text-align: center;"> <p>مركب مكون من العنصرين A, B. الكتلة الكلية = 4 (A) + 8 (B) الكتلة الكلية = 8 (B) الكتلة الكلية = 4 (A)</p> <p>ذرات العنصر (A) ذرات العنصر (B)</p> </div> |                                     |
| تطبيقات                                     | <p>س ١- قارن الطرائق المستعملة من قبل الفلاسفة الإغريق وجون دالتون لدراسة الذرة.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>س ٢- فسّر العلاقة بين نظرية دالتون للذرة وحفظ الكتلة .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>س ٣- تمكن جون دالتون من دعم فرضيته في حين لم يتمكن الفلاسفة الإغريق من ذلك .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>  |                                     |

|              |                                |         |
|--------------|--------------------------------|---------|
| الفصل الثالث | تركيب الذرة<br>تعريف الذرة 3.2 | الصف 17 |
| المادة       | الذرة                          | الصف 17 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| تقويم ختامي للدرس | The Atom |
|-------------------|----------|

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| اسم الطالب | الدرجة | 10 |
|------------|--------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| الزمن : 10 دقائق | 17 |
|------------------|----|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| الأهداف:<br>1. تعرف الذرة . | <p><b>تعريف الذرة</b></p> <p>الذرة هي أصغر .....</p> <p><b>دلائل على صغر حجم الذرة</b></p> <p>- يبلغ نصف قطر ذرة النحاس الواحدة <math>1.28 \times 10^{-10} \text{ m}</math></p> <p>- يقدر عدد الذرات في قطعة صلبة من العملة النحاسية بحوالي <math>2.9 \times 10^{22} \text{ atoms}</math></p> <p>- أي ما يقدر بخمسة تريليون مرة أكبر من عدد سكان العالم في عام 2006 م .</p> <p>- فإذا وضعنا <math>6.5 \times 10^9</math> ذرة من النحاس جنباً إلى جنب فسوف يتكون خط من ذرات النحاس طوله أقل من متر واحد .</p> <p>- تخيل أنك كبرت الذرة لتصبح مثل حجم البرتقالة فكأنك كبرت برتقاله لتصبح في حجم الكرة الأرضية.</p> <p><b>جهاز STM واستخدامه</b></p> <p>هو جهاز يسمى ..... الأنوبي ..... الذرات وكذلك ..... الذرات . يستخدم في السماح لنا .....</p> <p>أن العلماء قادرين على جعل ذرات منفردة تتحرك لتكون أشكالاً مختلفة والتي قد تؤدي إلى صناعة آلات بحجم الجزيئ.</p> <p><b>العالم لمكتشف</b></p> <p>السير وليام كروكس</p> <p><b>تجربة أنبوب أشعة المهبط ( الكاثود ) .</b></p> <p>أشعة المهبط هي إشعاعات تخرج من ..... وتنتقل إلى ..... في أنبوب أشعة .....</p> <p><b>أنبوب أشعة المهبط ( الكاثود )</b></p> <p>الشكل 3-6 أنبوب أشعة المهبط، وهو أنبوب له قطبان: هما المهبط والمصعد. عندما يمر تياراً كهربائياً قمته تأثير فولتية متناحية، تنتقل الكهربياء من المهبط إلى المصعد.</p> <p><b>اكتشاف الإلكترون.</b></p> <p>- استطاع طومسون تحديد نسبة شحنة هذه الجسيمات إلى كتلتها ثم قارن هذه النسبة بنسب ذرة الهيدروجين.</p> <p>- استنتج طومسون أن كتلة الجسم المشحون ( الإلكترون ) أقل بكثير من كتلة ذرة الهيدروجين .</p> <p>- استطاع اكتشاف أول جسيم من الجسيمات المكونة للذرة وهو الإلكترون.</p> <p>- الإلكترون هو جسيم ..... الشحنة ..... الحركة ويوجد في جميع أشكال المادة . ويرمز له بالرمز ( )</p> <p><b>تجربة طومسون على أنبوب أشعة المهبط</b></p> <p>الشكل 3-7 عند القيام بعمل ثقب صغير في مركز الأنبود يتشح شعاع رفيع من الإلكترونات يمكن الكشف عنه بطلاء الطرف الآخر للأنبوب بالفوسفور الذي يشع عند اصطدام الإلكترونات به.</p> <p><b>نموذج طومسون</b></p> <p>اقترح طومسون نموذجاً للذرة يتكون هذا النموذج من:<br/>- ذرات ..... الشكل مكونة من شحنات ..... موزعة بانتظام.<br/>مغروس فيها ..... منفردة ..... الشحنة.</p> <p>الذرة تحتوي على شحنات موجبة موزعة بانتظام</p> <p>إلكترونات</p> <p><b>تجربة قطرة الزيت لاكتشاف كتلة الإلكترون وشحنته .</b></p> <p>كتلة الإلكترون = ..... = كتلة ذرة الهيدروجين .</p> |
|-----------------------------|---|

|              |                                |                |                   |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| الفصل الثالث | تركيب الذرة<br>تعريف الذرة 3.2 | الصف<br>المادة | الصف الثالث       |
| The Nucleus  |                                | النواة         | تقويم ختامي للدرس |
| اسم الطالب   | الدرجة                         | الدرجة         | 10                |

18

الزمن : 10 دقائق

أجب عن جميع الأسئلة التالية :

## الاكتشاف

## العالم المكتشف

| ذرفورد                      | - تجربة رذرفورد ودراسة أثر جسيمات ألفا الموجبة الشحنة على المادة (لاكتشاف النواة).<br>- النواة هي الذرة جدا الشحنة كثيفة تحتوي على   |                        |                   |                |                         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
|-----------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|--|--|--|--------|------------------------|----------|--|--|--|---|-------------------------|-----------|--|--|--|---|-------------------------|
| تجربة رذرفورد               |  <p>مكعب من الرصاص يحتوي على مصدر يشع جسيمات ألفا<br/>صندوق شاشة مغلفة بكتيرينات الحارصين<br/>مسار جسيمات ألفا<br/>صفيحة ذهب<br/>انحراف جسيمات ألفا بزوايا كبيرة<br/>مكعب من الرصاص<br/>جسيمات ألفا<br/>صندوق شاشة مغلفة بكتيرينات الحارصين<br/>مسار جسيمات ألفا<br/>صفيحة ذهب<br/>انحراف جسيمات ألفا بزوايا صغيرة<br/>مكعب من الرصاص<br/>جسيمات ألفا<br/>صندوق شاشة مغلفة بكتيرينات الحارصين<br/>مسار جسيمات ألفا<br/>صفيحة ذهب<br/>انحراف جسيمات ألفا بزوايا كبيرة<br/>مكعب من الرصاص<br/>جسيمات ألفا<br/>صندوق شاشة مغلفة بكتيرينات الحارصين<br/>مسار جسيمات ألفا<br/>صفيحة ذهب<br/>انحراف جسيمات ألفا بزوايا صغيرة</p>   |                        |                   |                |                         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| نموذج رذرفورد للذرة .       | - الذرة تتكون من ..... كثيفة ..... الشحنة . وتمثل معظم ..... الذرة.<br>محاطة ..... سالبة الشحنة تتحرك في الفراغ حول النواة.<br>- الذرة متعادلة كهربائيا ( علل )  |                        |                   |                |                         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| رذرفورد واكتشاف البروتون    | - استنتج العالم رذرفورد أن النواة تحتوي على جسيمات تسمى البروتون هو جسيم ..... يحمل شحنة تساوي شحنة ..... لكنهما ويرمز له بالرمز ( ) .   |                        |                   |                |                         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| شادويك واكتشاف النيوترون    | - توصل العالم شادويك إلى أن النواة تحتوي على جسيمات متعادلة تسمى النيوترون هو جسيم ..... كتلته قريبة من كتلة ..... ولكنه لا يحمل شحنة ويرمز له بالرمز ( ) .<br>- كتلة النيوترون قريبة من كتلة البروتون . وكتلة البروتون أكبر من كتلة الإلكترون بحوالي 1840 مرة.  |                        |                   |                |                         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| نموذج الذرة في العصر الحديث | - الذرة كروية الشكل و تتكون من ثلاث جسيمات ذرية أساسية هي :<br>1- .....<br>2- .....<br>3- .....<br>تحتوي الذرة على ..... صغيرة الحجم وكثيفة مكونة من شحنات ..... محاطة .....<br>معظم حجم الذرة ..... ويحتوي على إلكترونات سريعة الحركة تتحرك في الفراغ المحيط بالنواة.<br>تتكون النواة من ..... متعادلة الشحنة و ..... موجبة الشحنة.<br>تحتوي النواة على أكثر من 99,97% من كتلة الذرة وتشغل حوالي 0.0001 من حجم الذرة.<br>أي أن قطر الذرة أكبر من قطر النواة بعشرة آلاف مرة.<br>الذرة متعادلة كهربائيا أي أن عدد البروتونات في النواة يعادل عدد الإلكترونات المحيطة بها .<br>توصل العلماء حديثا إلى أن البروتونات و النيوترونات مكونة من جسيمات تدعى .....<br>س 1- أكمل خواص الجسيمات المكونة للذرة في الجدول. |                        |                   |                |                         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| تطبيقات:                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>الجسيمات المكونة للذرة</th> <th>الرمز</th> <th>الموقع</th> <th>الشحنة الكهربائية</th> <th>الكتلة النسبية</th> <th>الكتلة الحقيقية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الإلكترون</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1/1840</td> <td><math>9.12 \times 10^{-28}</math></td> </tr> <tr> <td>البروتون</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td><math>1.673 \times 10^{-24}</math></td> </tr> <tr> <td>النيوترون</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td><math>1.675 \times 10^{-24}</math></td> </tr> </tbody> </table>  | الجسيمات المكونة للذرة | الرمز             | الموقع         | الشحنة الكهربائية       | الكتلة النسبية | الكتلة الحقيقية | الإلكترون |  |  |  | 1/1840 | $9.12 \times 10^{-28}$ | البروتون |  |  |  | 1 | $1.673 \times 10^{-24}$ | النيوترون |  |  |  | 1 | $1.675 \times 10^{-24}$ |
| الجسيمات المكونة للذرة      | الرمز  | الموقع                 | الشحنة الكهربائية | الكتلة النسبية | الكتلة الحقيقية         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| الإلكترون                   |  |                        |                   | 1/1840         | $9.12 \times 10^{-28}$  |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| البروتون                    |  |                        |                   | 1              | $1.673 \times 10^{-24}$ |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| النيوترون                   |  |                        |                   | 1              | $1.675 \times 10^{-24}$ |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| خواص الذرة                  | خواص الذرة هي:<br>1- أصغر جسيم في .....<br>2- تحمل جميع ..... العنصر<br>3- ..... الشحنة.<br>4- شكلها .....   |                        |                   |                |                         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| مكونات الذرة                | تتكون الذرة من :<br>1- .....<br>2- .....   |                        |                   |                |                         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |
| مكونات النواة               | تحتوي النواة على :<br>1- .....<br>2- .....   |                        |                   |                |                         |                |                 |           |  |  |  |        |                        |          |  |  |  |   |                         |           |  |  |  |   |                         |

2. تمييز بين الجسيمات المكونة للذرة من حيث الشحنة والكتلة.

3. تصف تركيب الذرة متضمنا مواقع الجسيمات المكونة للذرة.

## الواجب المنزلي

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| الفصل الثالث | تركيب الذرة<br>تعريف الذرة 2 - 3<br>..... / ..... / ١٤٣٦ هـ | الصف<br>١ ث      |
|              |   | المادة<br>كيمياء |

تعريف الذرة

الواجب المنزلي للدرس

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| اسم الطالب | الدرجة | ١٠ |
|------------|--------|----|

أجب عن جميع الأسئلة التالية :

1- C

س ١- صف تركيب الذرة وحدد موقع كل جسيم فيها ؟  
ج ١-

س ٢- قارن بين نموذج طومسون ونموذج رذرفورد ؟  
ج ٢-

س ٣- فسر سبب تعادل الذرات كهربائياً ؟  
ج ٣-

ملاحظات :

توقيع المعلم :

|              |                                     |                |              |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| الفصل الثالث | تركيب الذرة<br>كيف تختلف الذرات 3.3 | الصف<br>المادة | ا١<br>كيمياء |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|

|               |                                    |                   |
|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Atomic Number | العدد الذري والنظائر والعدد الكتلي | تقويم ختامي للدرس |
|---------------|------------------------------------|-------------------|

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| اسم الطالب | الدرجة | الدرجة |
| 1٠         |        |        |

|    |                  |                               |
|----|------------------|-------------------------------|
| 19 | الزمن : ١٠ دقائق | أجب عن جميع الأسئلة التالية : |
|----|------------------|-------------------------------|

### العدد الذري والعدد الكتلي :

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| العدد الذري | تعريفه   | هو عدد ..... في ..... |
| أيه يلب     | في الجدول الدوري يكتب ..... رمز العنصر (X) ويكتب مع الرمز في يسار و ..... رمز العنصر <sup>X</sup> العدد الذري. |                       |
| قانونه      | في الذرة المتعادلة الشحنة فقط : عدد البروتونات = عدد الإلكترونات.  |                       |

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| العدد الكتلي | تعريفه   | هو ..... |
| أيه يلب      | يكتب العدد الكتلي في العنصر يسار و ..... رمز العنصر.   |          |
| مثال         | الرقم (13) يشير إلى عدد البروتونات أو العدد الذري . و الرقم (27) يشير إلى العدد الكتلي .<br>- <sup>27</sup> / <sub>13</sub> Al |          |

|          |  |
|----------|--|
| القوانين | - العدد الذري = عدد .....<br>- العدد الكتلي = العدد ..... + عدد .....<br>- عدد النيوترونات = العدد الكتلي ..... العدد الذري. |
|----------|--|

### مثال 3.1 أكمل الجدول التالي :

| م | العنصر | العدد الذري | عدد البروتونات | عدد الإلكترونات | عدد النيوترونات | العدد الكتلي |
|---|--------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| a | Pb     | 82          |                |                 | 125             |              |
| b |        |             | 8              |                 |                 | 16           |
| c |        |             |                | 30              | 35              |              |

### مسائل تدريبية :

|  |   |
|--|---|
| 13- ما العنصر الذي تحتوي ذرته على 66 إلكترونات ؟ | 14- ما العنصر الذي تحتوي ذرته على 14 بروتونات ؟ |
|--|---|

### النظائر والعدد الكتلي :

|                    |  |
|--------------------|--|
| النظائر            | هي .....   |
| من أمثلة النظائر   | ١- نظائر البوتاسيوم <sup>39</sup> / <sub>19</sub> K <sup>40</sup> / <sub>19</sub> K <sup>41</sup> / <sub>19</sub> K<br>٢- نظائر النحاس <sup>63</sup> / <sub>29</sub> Cu <sup>64</sup> / <sub>29</sub> Cu |
| الاختلاف والتشابه  | تختلف النظائر عن بعضها البعض في العدد ..... وعدد ..... وتتشابه في عدد ..... وعدد .....   |
| كتلة النظائر       | كلما زاد عدد النيوترونات للنظائر تزداد كتلتها.   |
| تحديد النظائر      | يعرف كل نظير من نظائر العنصر بعدده الكتلي.<br>فمثلا : نظير النحاس الذي له العدد الكتلي 63 يكتب (نحاس - 63) أو (Cu- 63).  |
| النظائر في الطبيعة | النظائر في الطبيعة توجد على هيئة خليط من النظائر ونسبتها ثابتة.  |

### مثال 3.2 حدد عدد البروتونات والإلكترونات والنيوترونات في نظير النيون وسم هذا النظير وأعطه رمزا :

| بيانات نظير النيون |             |              |   |
|--------------------|-------------|--------------|---|
| العنصر             | العدد الذري | العدد الكتلي |   |
| النيون             | 10          | 22           | a |

|                   |                    |                    |               |               |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| ١- عدد البروتونات | ٢- عدد الإلكترونات | ٣- عدد النيوترونات | ٤- اسم النظير | ٥- رمز النظير |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|

17- العدد الكتلي لذرة يساوي 55 وعدد النيوترونات هو العدد الذري مضافا إليه خمسة . ما عدد البروتونات والإلكترونات والنيوترونات في الذرة ؟ وما رمز العنصر ؟

الأهداف :  
١. تفسر دور العدد الذري في تحديد هوية الذرة .  
٢. تعرف النظائر.

|              |                                   |                |              |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| الفصل الثالث | تركيب الذرة<br>كيف تختلف الذرات 3 | الصف<br>المادة | ا١<br>كيمياء |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|

|                   |            |               |
|-------------------|------------|---------------|
| تقويم ختامي للدرس | كتل الذرات | Mass Of Atoms |
|-------------------|------------|---------------|

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| اسم الطالب | الدرجة | ١٠ |
|------------|--------|----|

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| الزمن : ١٠ دقائق | أجب عن جميع الأسئلة التالية : |
|------------------|-------------------------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>وحدة الكتل الذرية :</b>  |                                   |
| كتلة البروتون والنيوترون تقريبا تساوي .....<br>وكتلة الإلكترون تقريبا تساوي .....   | كتلة الجسيمات                     |
| لا حظ كتل هذه الجسيمات صغيرة جدا ويصعب التعامل بها.<br>لذا قام العلماء بتطوير طريقة جديدة لقياس كتلة الذرة بالنسبة لكتلة ذرة معينة معيارية. | قياس كتلة الذرة                   |
| هذه الذرة المعينة المعيارية هي ذرة ..... ذات الكتلة الذرية .....  | الذرة المعيارية                   |
| هي .....  | وحدة الكتلة الذرية ( amu )        |
| وحدة الكتلة الذرية تساوي تقريبا كتلة بروتون واحد أو نيوترون واحد .  | ما ذا تساوي وحدة الكتلة الذرية    |
| الجدول التالي يبين كتل الجسيمات المكونة للذرة بدلالة وحدة الكتل الذرية ( amu ).   |                                   |
| الجسيمات المكونة للذرة  | الكتلة ( وحدة كتلة ذرية ) ( amu ) |
| الكرون  | 0.000549                          |
| بروتون  | 1.007276                          |
| نيوترون   | 1.008665                          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>الكتلة الذرية.</b> |   |
| تعريفها               | هي متوسط ..... النظائر .....  |
| تعليل                 | الكتلة الذرية ليست عدد صحيح دائما ( علل ) لأن للنظائر .....   |
| نسبة النظائر          | النظير الذي له كتلة ذرية قريبة من الكتلة الذرية للعنصر يحتمل أن يكون له أعلى نسبة وجود في الطبيعة . |

|   |     |
|---|-----|
| <b>القانون المستخدم لحساب الكتلة الذرية للعنصر المكون من نظيران</b>   |     |
| الكتلة الذرية للعنصر = ( النسبة المئوية للنظير الأول × كتلته الذرية ) + ( النسبة المئوية للنظير الثاني × كتلته الذرية ) |     |
| 100   | 100 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>نطبقه على حساب الكتلة الذرية المتوسطة لمناصر.</b>  |             |
| ١- احسب الكتلة الذرية للكروم الذي يوجد في الطبيعة على شكل <sup>35</sup> Cr بنسبة % 75.78 و <sup>37</sup> Cr بنسبة % 24.22 . | جـ ١- ..... |
| .....   | .....       |
| .....   | .....       |

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| <b>مثال 3-3</b> - احسب الكتلة الذرية اعتمادا على البيانات الموجودة في الجدول . ثم حدد هذا العنصر الذي يستعمل طبيا. |                |                  |
| نسب وجود نظائر العنصر X  |                |                  |
| النظير   | الكتلة ( amu ) | نسبة وجود النظير |
| <sup>6</sup> X   | 6.015          | 7.59%            |
| <sup>7</sup> X   | 7.016          | 92.41%           |

|  |  |
|--|--|
| <b>مسائل تدريجية : 18 -</b> للبورون B نظيران في الطبيعة هما البورون - 10 (نسبة وجوده % 19.8) وكتلته 10.013 amu . والبورون - 11 ( نسبة وجوده % 80.2) وكتلته 11.009 amu . احسب الكتلة الذرية للبورون . |  |
| .....  |  |
| .....  |  |
| <b>19- للنتروجين نظيران في الطبيعة هما نتروجين - 14 ونتروجين - 15. وكتلته الذرية 14.007 أي النظيرين له نسبة وجود أكبر في الطبيعة؟</b>  |  |
| .....  |  |
| .....  |  |

٣. تفسر سبب أن الكتل الذرية ليست أعدادا صحيحة .  
٤. تحسب عدد البروتونات والنيوترونات والالكترونات في الذرة مستعملا العدد الكتلي والعدد الذري .

## الواجب المنزلي

|              |  |                |        |
|--------------|--|----------------|--------|
| الفصل الثالث | تركيب الذرة<br>كيف نختلف الذرات 3 - 3<br>..... / ..... / ..... ١٤٣٦ هـ | الصف<br>المادة | ١<br>ث |
|--------------|--|----------------|--------|

كيف نختلف الذرات

الواجب المنزلي للدرس

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| اسم الطالب | الدرجة | ١٠ |
|------------|--------|----|

أجب عن جميع الأسئلة التالية :

2- C

س ١- ما عدد البروتونات وعدد الإلكترونات الموجودة في ذرة عنصر عدده الذري 44 ؟  
ج ١-

س ٢- الكربون C العدد الكتلي لذرة الكربون 12 والعدد الذري لها 6 . ما عدد النيوترونات في نواتها ؟  
ج ٢-

س ٣- الزئبق Hg يحتوي أحد نظائره الزئبق على 80 بروتونا و 120 نيوترونا . ما العدد الكتلي لهذا النظير ؟  
ج ٣-

س ٤- للنحاس Cu نظيران في الطبيعة هما النحاس - 63 ( نسبة وجوده % 69.2 ) وكتلته 62.93 amu .  
النحاس - 65 ( نسبة وجوده % 30.8 ) وكتلته 64.928 amu . احسب الكتلة الذرية للنحاس .  
ج ٤-

ملاحظات :

توقيع المعلم :



|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| الفصل الثالث | تركيب الذرة                               | الصف 1        |
|              | الأنوية غير المستقرة والتحلل الإشعاعي 3.4 | المادة كيمياء |

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| تقويم ختامي للدرس | النشاط الإشعاعي | Radioactivity |
|-------------------|-----------------|---------------|

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| اسم الطالب | الدرجة | 10 |
|------------|--------|----|

|                               |                  |    |
|-------------------------------|------------------|----|
| أجب عن جميع الأسئلة التالية : | الزمن : 10 دقائق | 21 |
|-------------------------------|------------------|----|

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>النشاط الإشعاعي.</b> |  |  |
| التفاعل الكيميائي       | هو تغير يحدث لمادة أو أكثر عنه مواد .....                                |  |
| ما الذي يتضمنه          | يتضمن تغير في عدد ..... للذرة بحيث تبقى هوية العنصر .....                |  |
| التفاعل النووي          | هو تفاعل يتضمن ..... في ..... الذرة ويستطيع أن يحول عنصرا إلى ..... آخر. |  |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>الفاعلات النووية.</b> |  |  |
| النشاط الإشعاعي          | هو العملية التي تقوم من خلالها بعض ..... بإصدار .....  |  |
| الإشعاع                  | هو الأشعة و ..... المنبعثة من المواد .....   |  |
| ملاحظة                   | تصدر الذرات المشعة إشعاعات ( علل ) لأن أنويتها ..... لذلك تطلق إشعاعات (تفقد طاقة ) لتصل إلى حالة الاستقرار. |  |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>التحلل الإشعاعي.</b> |   |  |
| التحلل الإشعاعي         | هو فقد ..... من الأنوية غير ..... الطاقة بإصدار ..... في عملية .....                      |  |
| ملاحظة                  | تتعرض الذرات غير المستقرة لتحلل إشعاعي وتتحول إلى ذرات مستقرة هي في الغالب ذرات عنصر آخر. |  |

**أنواع الإشعاعات .**  
- تمكن العلماء عند إمرار أشعة صادرة من مصدر مشع بين صفيحتين مشحونتين كهربائيا من تعرف ثلاثة أنواع من الأشعة حسب شحنتها.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>إشعة ألفا [ α ]</b> |   |
| أشعة ألفا              | هي الأشعة التي ..... في اتجاه الصفيحة .....   |
| مكونات جسيم ألفا       | تتكون أشعة ألفا من جسيمات ألفا .<br>- وجسيم ألفا يتكون من ..... و .....<br>و تحمل هذه الجسيمات شحنة موجبة ثنائية $He^{++}$ .<br>وهو يعادل نواة ذرة الهيليوم - 4 .   |
| رمز الجسيم             | يمكن التعبير عن جسيم ألفا بـ $^4_2He$ أو $\alpha$   |
| تكوين جسيم ألفا        | ينتج جسيم ألفا من تحلل مادة الراديوم - 226 إلى الرادون - 222 كما هو موضح في المعادلة :<br>الراديوم - 226 ← الرادون - 222 + جسيم ألفا .<br>$^{226}_{88}Ra \longrightarrow ^{222}_{86}Rn + \alpha$<br>- من المعادلة نلاحظ أن الذي حدث في هذا التفاعل النووي هو نقص بروتونين ونيوترونين. |
| التغيرات المصاحبة      | - العدد الذري بمقدار ( 2 ) والعدد الكتلي ..... بمقدار (4).<br>- يتكون عنصر جديد عدده الذري ..... من العنصر الأصلي بمقدار ( 2 ).   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>إشعة بيتا [ β ]</b> |  |
| أشعة بيتا              | هي الأشعة التي ..... في اتجاه الصفيحة .....  |
| مكونات جسيم بيتا       | يتكون جسيم بيتا من إلكترون ذي شحنة .....   |
| رمز الجسيم             | $\beta$ أو $e^-$   |
| تكوين جسيم بيتا        | - أحد نيوترونات ذرة الكربون الثمانية في النواة يتحول إلى بروتون وإلكترون في نفس الوقت.<br>- يبقى البروتون في النواة وتزيد أعداد البروتونات وحينها يتحول الكربون إلى ذرة نيتروجين .<br>- وأما الإلكترون فينتقل من النواة إلى السحابة الإلكترونية مكونا جسيم بيتا عبارة عن إلكترون سالب الشحنة $e^-$ .<br>- ينتج جسيم بيتا من تحلل مادة الكربون - 14 إلى النيتروجين - 14 كما هو موضح في المعادلة :<br>كربون - 14 ← نيتروجين - 14 + جسيم بيتا<br>$^{14}_6C \longrightarrow ^{14}_7N + \beta$<br>- من المعادلة نلاحظ أن الذي حدث في التفاعل النووي هو ثبات قيمة عدد الكتلة و تغير العدد الذري ونقص إلكترون واحد. |
| التغيرات المصاحبة      | - ..... العدد الذري بمقدار ( ) و يبقى العدد .....<br>- يتكون عنصر جديد عدده الذري ..... عن العنصر الأصلي بمقدار ( ) .  |


الأهداف: 1. تفسر العلاقة بين الأنوية غير المستقرة والتحلل الإشعاعي . 2. تصف اشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة جاما بدلالة الكتلة والشحنة.

## إشعة جاما [ $\gamma$ ]

|                 |  |
|-----------------|--|
| إشعة جاما       | هي إشعاعات ..... الطاقة ليس لها ..... و ..... الشحنة ولا تنحرف في المجال المغناطيسي أو الكهربائي وترافق عادة أشعة بيتا وأشعة ألفا وهي مسؤولة عن معظم الطاقة التي يتم فقدانها خلال التحلل الإشعاعي. |
| ملاحظات         | عند تكوين أشعة جاما لا يصاحب ذلك تكوين لذرات جديدة (علل) لأن اشعة جاما ليس .....   |
| رمز الجسيم      | $\gamma$   |
| تكوين جسيم جاما | - ترافق أشعة جاما انبعاث جسيمات ألفا عند تحلل عنصر اليورانيوم - 238 :<br>${}_{92}^{238}U \longrightarrow {}_{90}^{234}Th + \alpha + 2\gamma$   |
|                 | - من المعادلة نلاحظ انه يحدث ١- نقص بروتونين ونيوترونين ٢- تكون عنصر جديد ٣- تكون أشعة ألفا ٤- تكون اشعة جاما.   |

|                |   |
|----------------|---|
| استقرار النواة | - العامل الذي يحدد استقرار النواة ( ثبات الذرة ) هو نسبة ..... إلى ..... في نواة الذرة.<br>- فعندما تكون هذه النسبة كبيرة أو صغيرة تصبح نوى الذرات ..... مما يجعل الذرة مشعة.<br>- الذرات المشعة حتى تصل إلى حالة الاستقرار فإنها تفقد إشعاعات أو جسيمات.<br>- وتتوقف الذرة عن الإشعاع عندما تصبح مستقرة. |
|----------------|---|

الشكل 21-3 يحرف المجال الكهربائي الأشعة باتجاهات مختلفة، اعتيادًا على الشحنة الكهربائية لهذه الإشعاعات. فسر. لماذا انحرفت جسيمات بيتا نحو الصفيحة الموجبة وجسيمات ألفا نحو الصفيحة السالبة، ولم تنحرف أشعة جاما؟



المفاهيم عبر المواقع الإلكترونية  
 شكل تفاعلي: لمعرفة المزيد عن انحراف الأشعة ارجع إلى  
 الموقع: [www.obeikaneducation.com](http://www.obeikaneducation.com)

### خواص الجسيمات .

| خواص الإشعاعات |                        |                               | جدول 3-5     |
|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------|
| جاما           | بيتا                   | ألفا                          |              |
| $\gamma$       | $e^-$ أو $\beta$       | ${}^4_2\text{He}$ أو $\alpha$ | الرمز        |
| 0              | $\frac{1}{1840}$       | 4                             | الكتلة (amu) |
| 0              | $9.11 \times 10^{-31}$ | $6.65 \times 10^{-27}$        | الكتلة (kg)  |
| 0              | 1-                     | 2+                            | الشحنة       |

## جهاز مطياف الكتلة

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| الهدف منه | هي جهاز يستخدم لتحديد ..... |
|-----------|-----------------------------|

### تطبيقات .

س١- قارن بين التفاعل الكيميائي والتفاعل النووي.

.....

س٢- عرف التحلل الإشعاعي ؟

.....

س٣- عرف أشعة ألفا ؟

.....

س٤- عرف أشعة بيتا ؟

.....

س٥- عرف أشعة جاما ؟

.....

س٦- متى تكون الذرة مستقرة ؟

.....

س٧- علل : بعض الذرات مشعة ؟

.....